

Ki[®]
magazin

KOSMETIK
INTERNATIONAL



5 | 2017


Anti-age

**Нитевые технологии:
эволюция осложнений**

Здоровье кожи
с точки зрения эндокринолога

Сразу два новых проекта:
«МОЛОДОЙ ДОКТОР В КЛИНИКЕ»
«ВРАЧ В РОЛИ ПАЦИЕНТА»

16+



ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ: *сложные случаи*

Некоторые врачи считают химические пилинги достаточно тривиальными, хотя и эффективными процедурами: протоколы давно созданы и годами отработаны, восстановительный период понятен и прогнозируем. Однако классические схемы работают далеко не всегда. В каких случаях специалисту нужно быть предельно осторожным? И как изменять протоколы в зависимости от состояния кожного покрова и сопутствующих заболеваний пациента?



ТАТЬЯНА ТРОЦЕНКО,

дерматолог, косметолог, ведущий тренинг-менеджер
компании «Астрейя»
Москва

Химические пилинги уже долгие годы применяют для коррекции биологического старения кожи. Суть метода сводится к воздействию на кожу химическими агентами с целью спровоцировать контролируемую воспалительную реакцию на ее поверхности и получить клеточный ответ, приводящий к улучшению ее качественных характеристик. Чем старше пациент, чем ярче выражены возрастные изменения, тем интенсивнее должно быть воздействие пилингового состава.

На сегодняшний день в косметологической науке выделяют четыре возрастные группы пациентов: 25–35 лет, 35–45 лет, 45–55 лет, 55 лет и старше. Для каждой группы характерен определенный набор так называемых возрастных дефектов. Интенсивность воздействия выбирается в зависимости от степени их выраженности, и выполняют химический пилинг согласно отработанным протоколам процедур. Однако нередко на прием приходят пациенты с таким состоянием кожи, когда во избежание постпилинговых осложнений требуется особая подготовка и особая программа коррекции.

ПАЦИЕНТЫ С ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ КОЖИ

Гиперчувствительность кожи следует отличать от сосудистой реакции. Например, чересчур розовый румянец на щеках или пятна на шее и зоне декольте свидетельствуют о сосудистых

дермографизм и т.д. При этом внешне кожа может выглядеть абсолютно спокойной. Вывод об уровне чувствительности кожного покрова делается на основании тщательного сбора анамнеза.

В случае, когда косметолог сомневается в целесообразности проведения химического пи-



Резорцин, входящий в состав пилинга Джесснера, очень токсичен. Во избежание осложнений его нельзя применять пациентам с фототипом кожи выше III по Фитцпатрику (а с III фототипом можно использовать только водно-спиртовые пилинги Джесснера), а также с тонкой, дряблой кожей.

проблемах, но не о реактивности кожи.

Чувствительностью принято считать реакцию нервных окончаний при экземе или экземоподобном состоянии, которые могут протекать и в латентной форме; атопический дерматит; постожоговое состояние; гиперестезию (понижение порога чувствительности при тепловом или физическом воздействии);

линга или не уверен в том, что удалось собрать полный и достоверный анамнез, необходимо направить пациента на следующие исследования и консультации:

- 1) консультацию невролога, который при необходимости назначит седативные препараты;
- 2) МРТ — для определения состояния сосудистого русла;

3) анализ крови на наличие паразитарной интоксикации.

Предпилингвая подготовка

Если нет противопоказаний к химическому пилингу, то косме-

ном, пантенолом и т.д.; выполняют лимфодренажный массаж.

Для укрепления барьерной функции гиперчувствительной кожи и уменьшения трансэпидермальной потери влаги пациенту желательно пересмотреть

чают препараты, содержащие омега-3 длительным курсом по 3–5 месяцев; очищение кожи рекомендуется проводить только мицеллярной водой.

Поскольку чувствительная кожа склонна к щелочной реакции, важно выровнять ее pH. Для закисления pH проводят ацидотерапию, которая включает инъекции мезококтейлей, пероральный прием и наружное нанесение препаратов с кислотами.

Легкие поверхностные пилинги

Легкие поверхностные пилинги рекомендованы для коррекции признаков старения у пациентов 25–35 лет.

Первые две процедуры проводят в более щадящем режиме, чем предусмотрено протоколом. Например, если используются антиоксидантные кислоты (фитиновая, феруловая, молочная), то классический протокол подразумевает их экспозицию в течение 5–7 минут, 1 раз в 2 недели. В случае с гиперчувствительной

Омолаживающие пилинги для кожи с *acne tarda* подбирают в зависимости от ее типа. Для сухой — водно-спиртовой состав с высокой концентрацией основного компонента (обычно молочная кислота более 50%). Для жирной или бывшей жирной — миндальный гелевый. Универсальным антивозрастным пилингом, обладающим способностью бороться с *P. acne* и устранять застойные пятна, считают состав с пировиноградной кислотой.

толог назначает препараты или процедуры, которые готовят кожу к воздействию химических агентов. За 1–1,5 месяца до курса пилингов начинают применять средства, снижающие чувствительность кожи. На сегодняшний день самыми эффективными в этом плане считаются пептидные мезопрепараты. Если реакция на уколы у пациента очень высокая (низкий болевой порог), то за 2 часа до процедуры необходим пероральный прием анальгетика.

Наиболее сильными пептидными комплексами, работающими с чувствительной кожей, считаются те, которые содержат пальмитоил тетрапептид-7. Он снижает выработку интерлейкина-6, уменьшая активность выброса гистамина.

Кроме того, проводят курс профессиональных успокаивающих процедур с использованием коллагеновых листов, которые активируются не специальными активаторами, а обычной минеральной водой; применяют биоцеллюлозные маски с аллантои-

рацион питания в пользу увеличения потребления морской рыбы, яиц, орехов, печени, круп и пить не менее 1,5–2,0 литров воды в сутки. Перорально назна-




К «желтым» пилингам в качестве омолаживающих процедур можно приступать только в случае, когда снята или приведена в состояние ремиссии сопутствующая проблема.



Идеальный
желтый пилинг

Golden Yellow Peel

Новые стандарты
эффективности и безопасности
ретинолового пилинга



Реклама


Dermatime®

www.acosm.ru

Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «Астрей» • Тел.: +7 (495) 925-5162

INTERCHARM 2017
стенд 14 D12





Мезотерапевтические процедуры хорошо зарекомендовали себя на этапе подготовки к химическому пилингу. Их широко применяют при таких эстетических проблемах, осложняющих проведение пилинга, как гиперчувствительная кожа, купероз, розацеа и др.

кожей экспозицию уменьшают до 3–4 минут, а промежутки увеличивают до 3 недель. Это позволяет адаптировать кожу к химическому воздействию и последующие сеансы выполнять согласно рекомендациям производителя.

Во время процедуры необходимо применять средства с регенерирующим действием, которые наносят после нейтрализации пилинга или непосредственно на него (зависит от формы химического состава: водно-спиртовые пилинги не требуют нейтрализации, гелевые необходимо нейтрализовать). Между пилингами имеет смысл выполнять уход, направленный на снятие чувствительности кожи. Курс пилингов — 5–7 процедур.

Жесткие поверхностные пилинги

Эти пилинги рекомендованы для возрастной группы 35+. Сначала выполняют 2–3 процедуры легких поверхностных пилингов с регенерирующими препаратами, чтобы подготовить кожу к более серьезному воздействию: например, пировиноградную кислоту совмещают с ретиноидами (3–4 процедуры). Ретиноевый пилинг применяют на завершающем этапе.

Если кожа становится нормальной (перестает быть гиперчувствительной), то можно переходить к еще более сильным составам: ТСА, «желтому» ретиноевому, пилингу Джесснера.

Домашний уход после процедуры пилинга

Помимо косметических средств, обычно назначаемых на период реабилитации, рекомендуется наносить 1 раз в день «Фенистил гель».

КУПЕРОЗ

Проявления купероза становятся заметны, как правило, после 35 лет и могут быть как локальными, так и занимать все лицо. Проблема может сопровождаться и эритрозом, когда лицо приобретает красный или красновато-синюшный оттенок, а шея остается нормального цвета (на начальном этапе болезни эритроз может быть временным явлением).

Надо понимать, что наличие сосудистой патологии свидетельствует и о проблеме соединительной ткани. Соединительная ткань выполняет защитную, опорную и трофическую функ-


ции. При повышенной растяжимости кожи, ее хрупкости и мышечной гипотонии сосуды не могут оставаться эластичными. Это называют сосудистым синдромом, ему часто сопутствует и эндотелиальная дисфункция. Для нормализации состояния соединительной ткани применяют препараты с коллагеном и эластином.

Предпилингвая подготовка

Кожу с куперозом готовят к процедурам химических пилингов в течение 1–1,5 месяцев. Внутрь назначают ангиопротекторы, наружно — препараты с витаминами С, К1 и группы В. Кроме того, рекомендован курс мезотерапии (5–6 процедур). Причем первые 2–3 мезосеанса необходимо начинать с магистрального введения коктейля: от голеностопа до 7-го шейного позвонка. В его состав входят вещества с дренажным, противоотечным, сосудистым действием. Основа коктейля — органический кремний, служащий проводником других ингредиентов и оказывающий омолаживающий и увлажняющий эффекты.

Пилинг

Обычно в омолаживающих процедурах для кожи с куперозом применяют составы с молочной кислотой (10–20%), часто с добавлением аргинина, обладающего выраженным ангиопротекторным и anti-age действием. Первые 3–4 процедуры выполняют «под прикрытием» сосудистых препаратов с витамином С (сыворотки, маски, концентраты и т.д.). Их наносят после нейтрализации пилинга или непосредственно на него (зависит от формы химического состава). Добившись стойкой ремиссии купероза, переходят к «желтым» пилингам (от 2 до 6 сеансов в зависимости от марки препарата).



Вывод об уровне чувствительности кожного покрова делается на основании тщательного сбора анамнеза. Если косметолог не уверен в том, что удалось собрать полный анамнез, и сомневается в целесообразности проведения химического пилинга, следует назначить пациенту дополнительные исследования, в частности, анализ крови на наличие паразитарной интоксикации.

Домашний уход после процедуры пилинга

С 4–5-го дня после пилинга и вплоть до следующего сеанса в домашний уход вводят средство для укрепления сосудов с витамином С. Это же средство продолжают использовать и после окончания курса пилингов еще в течение нескольких месяцев. С 6–7-го дня 1 раз в неделю необходимо применять препарат с витамином А (например, с эфирами ретиноевой кислоты (бета-каротином, ретинол ацетатом, ретинол пальмитатом) или с чистым ретинолом; средства с ретиноевой кислотой и ретинальдегидом при куперозе не назначают). Витамин А оказывает выраженное сосудукрепляющее действие, так как способен достигать клеток эндотелия.

РОЗАЦЕА

Различают четыре стадии заболевания: эритематозную (*rosacea erythematosa*), папулезную (*rosacea papulosa*), пустулезную (*rosacea pustulosa*), ин-

фильтративно-продуктивную (*rhinophyma*).

Пилинги можно начинать использовать уже на первой стадии, когда приливая эритема (покраснение) на лице возникает под влиянием механических воздействий, солнца, температурных колебаний (чаще высокой температуры) и т.д. Ее продолжительность варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Вторая стадия отличается тем, что на фоне эритемы и утолщения кожи с большим количеством расширенных сосудов возникают изолированные или сгруппированные папулы. При дальнейшем прогрессировании заболевания узелки подвергаются нагноению, образуя папуло-пустулы и пустулы. На втором и третьем этапах развития розацеа пилинги также могут оказать выраженный терапевтический эффект.

Предпилиговая подготовка

Часто течение розацеа осложнено демодекозом. В этом случае сначала необходима акарицидная терапия, которая длится от 2 недель до месяца. Если де-

модекс не обнаружен, то подготовка к курсу пилингов такая же, как при куперозе. Кроме того, проводят 3–5 процедур криотерапии жидким азотом и мезотерапию (в состав препарата входит рутин мелилото). Как и при куперозе, первые 2–3 мезосеанса необходимо начинать с магистрального введения коктейля. Мезопрепараты для сухой кожи содержат гиалуроновую кислоту, для пористой и жирной кожи — ХАДН-гель. Обязательно назначают метронидазол и на его фоне приступают к процедурам химических пилингов.

Пилинг

При эритематозной и папулезной формах розацеа рекомендуются антиоксидантные монопилинги с фитиновой, молочной или феруловой кислотами и витамином С. «Закрывают» пилинг (то есть наносят непосредственно на пилинговый состав или после его нейтрализации) кремом «Розалиак».

При пустулезной форме розацеа хорошо зарекомендовали себя составы с азелаиновой кислотой (15–20–25%), либо ее комбинация с молочной (одной лишь молочной кислоты уже недостаточно). Производители обычно предлагают несколько препаратов для таких состояний кожи. В зависимости от возраста и стадии розацеа выбирают либо водно-спиртовой раствор (при выраженной пастозности кожи, но небольшом количестве высыпаний), либо гель (при значительном количестве высыпаний, но не очень пастозной коже). Если кожа и пастозная, и с большим количеством высыпаний, то используют комбинированный вариант: сначала 1–3 слоя водно-спиртового пилинга, потом, после высыхания его последнего слоя, не смывая, наносят гелевый пилинг и оставляют на 3–5 минут, затем все смывают. «Закрывают» кремом

«Розалиак». Несколько сеансов этих пилингов способны заметно улучшить состояние кожи за счет себорегулирующего и противовоспалительного эффектов. Добившись отсутствия новых высыпаний, можно подключать ретиноловые пилинги. Они позволяют достичь выраженного омолаживающего действия и укрепить стенку сосудов.

Домашний уход после процедуры пилинга

Дополнительно к тем препаратам, которые обычно назначают после пилингов на период восстановления, применяют «Метрогил гель».

ПОЗДНИЕ УГРИ (ACNE TARDA)

К *acne tarda* относят воспаленные папулы и пустулы, появляющиеся у людей после 25 лет и продолжающиеся вплоть до конца менопаузы. Часто это заболевание сопровождается высокой чувствительностью к тестостерону, гиперандрогенией или поликистозом яичников, поэтому для эффективной тера-

пии желательна предварительная консультация у профильных специалистов.

Предпилинговая подготовка

Предпилинговая подготовка заключается в проведении противовоспалительной терапии и санации кожи: курс антибиотиков тетрациклинового ряда (2 недели) или антиандроген спиронолактон (на 4–6 месяцев). Можно попробовать воздействовать

подбирают в зависимости от ее типа. Для сухой — водно-спиртовой пилинг с высокой концентрацией основного компонента (обычно молочная кислота более 50%). Для жирной или бывшей жирной — миндальный гелевый пилинг (гелевая форма позволяет составу проникать достаточно глубоко и депонироваться в нижних слоях эпидермиса).

Универсальным антивозрастным пилингом, обладающим



Если в состав отбеливающих препаратов входят гидрохинон и койевая кислота, обладающие цитотоксическим действием, пациентам рекомендуется изменить питьевой режим в сторону увеличения потребления жидкости.


только локально при помощи бензоилпероксида 5% (если кожа не чувствительная, то 10%) также в течение 2 недель.

Пилинг

Омолаживающие химические составы для кожи с акне тарда

способностью бороться с *P. acne* и устранять застойные пятна, является состав с пировиноградной кислотой.

Переходить к более сильным омолаживающим пилингам можно только после того, как удалось добиться стойкой ре-



Орехи и всевозможные крупы позволяют укрепить барьерную функцию гиперчувствительной кожи и уменьшить трансэпидермальную потерю влаги.

миссии акне тарда. В ином случае ТСА и пилинг Джесснера спровоцируют усиление высыпаний.

Домашний уход после процедуры пилинга

С 7-го дня после проведения процедуры пилинга рекомендуют увлажняющие средства для комбинированной кожи, мезотерапию или биоревитализацию.

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

Труднее всего поддается коррекции «леченая» гиперпигментация, то есть та, которая уже подвергалась тому или иному воздействию (отбеливающими препаратами, лазерами и пр.). Она считается стойкой, и работать с ней теми методами, которые были опробованы ранее, бесполезно. То же относится и к дермальной пигментации, сложнее других поддающейся терапии.

Предпилинговая подготовка

Предпилинговая подготовка заключается в назначении отбеливающих препаратов за 1–2 месяца до курса процедур и на протяжении всего времени их проведения. Однако необходимо предупредить пациентов о том, что выраженного эффекта эти средства не окажут, особенно, если речь идет о дермальной или смешанной пигментации. Их применяют для того, чтобы подготовить меланоциты к воздействию химических агентов и не спровоцировать осложнение в виде поствоспалительной гиперпигментации. Если в состав отбеливающих препаратов входят гидрохинон и койевая кислота, обладающие цитотоксическим действием, пациентам рекомендуется изменить питьевой режим в сторону увеличения по-



Криотерапия жидким азотом входит в число процедур, рекомендуемых в качестве подготовки к омолаживающим химическим пилингам для кожи с розацеа.

требления жидкости, наносить успокаивающие наружные препараты, чтобы не вызвать гиперчувствительности кожи, пользоваться средствами с высокой фотозащитой (SPF не менее 50), принимать антиоксиданты, например, с альфа-липоевой кислотой или стандартизированным экстрактом папоротника ликоподиума.

Пилинг

Химический состав выбирают в зависимости от глубины залегания пигмента. При эпидермальной пигментации достаточно легких поверхностных комбинированных пилингов с отбеливающим эффектом. Если пигментация смешанная и тем более дермальная, требуются срединные составы. Однако и в этом случае сначала придется выполнить 2–3 процедуры поверхностных пилингов с целью обновления эпидермиса, воздействия на меланоциты (ингибировать синтез меланина), подготовки кожи к серьезному воздействию, а также оказания омолаживающего действия. Для этого применяют комби-

нированные пилинги, которые содержат, например, пировиноградную, койевую кислоты и арбутин, или молочную (50% и выше), фитиновую, лимонную, яблочную кислоты.

К срединным омолаживающим пилингам относят ТСА (10–15–20%), кофейный (до 20%) или отбеливающий пилинг Джесснера (резорцин, молочная кислота, альфа- или бета-кислоты), считающиеся наиболее эффективными в ситуации, когда омоложение проводится на коже с гиперпигментацией. Однако резорцин, входящий в состав пилинга Джесснера, очень токсичен. Поэтому во избежание осложнений у него есть ряд четких противопоказаний: его нельзя применять пациентам с фототипом кожи выше III по Фитцпатрику (а с III фототипом можно использовать только водно-спиртовые пилинги Джесснера), а также с тонкой, дряблой кожей. Пациентам с гиперпигментацией часто назначают курс процедур, внутри которого поверхностные пилинги чередуют со срединными в соотношении 3:1. Это позволяет

минимизировать риск развития поствоспалительной гиперпигментации.

Домашний уход после процедуры пилинга

С 7-го дня после проведения пилинга назначают отбелива-

ющую терапию с применением средств, содержащих арбутин, гидрохинон, койевую кислоту, антиоксиданты. Проблема гиперпигментации считается полностью решенной, если в течение 4 месяцев после окончания курса процедур наблюдается

стойкая ремиссия, — только после этого можно отменить отбеливающие средства в домашнем уходе. KI

Подготовка к омолаживающим пилингам: ключевые моменты

- 1) Чем старше пациент, чем ярче выражены возрастные изменения, тем интенсивнее должно быть воздействие пилингового состава.
- 2) Химический пилинг проводят согласно отработанным протоколам. Однако нередко состояние кожи — во избежание постпилинговых осложнений — требует особой подготовки и особой программы коррекции.
- 3) При гиперчувствительной коже назначают пептидные мезопрепараты; успокаивающие процедуры с использованием коллагеновых листов, которые активируются минеральной водой; биоцеллюлозные маски с алантоином, пантенолом и др.; лимфодренажный массаж. Для укрепления барьерной функции кожи и уменьшения трансэпидермальной потери влаги пересматривают рацион питания и питьевой режим. Перорально — омега-3 препараты.
- 4) Кожу с куперозом готовят с помощью ангиопротекторов (внутри) и препаратов с витаминами С, К1 и группы В (наружно). Также рекомендован курс мезотерапии, который начинают с магистрального введения коктейля с дренажным, противоотечным и сосудистым действием. В основе коктейля — органический кремний.
- 5) При розацеа, если его течение осложнено демодекозом, сначала проводят акарицидную терапию. Если демодекс не обнаружен, то подготовка к пилингам такая же, как при куперозе. Кроме того, применяют криотерапию жидким азотом и мезотерапию (в состав препарата входит рутин мелилото). Мезопрепараты для сухой кожи содержат гиалуроновую кислоту, для пористой и жирной кожи — ХADN-гель. Обязательно назначают метронидазол и на его фоне приступают к пилингам.
- 6) Подготовка к пилингам при *acne tarda* заключается в противовоспалительной терапии и санации кожи: курс антибиотиков тетрациклинового ряда или антиандроген спиронолактон. Возможен вариант локального воздействия при помощи бензоилпероксида 5% (если кожа не чувствительная, то 10%).
- 7) Труднее всего поддается коррекции «леченая» гиперпигментация, — работать с ней методами, которые уже были опробованы, считается бесполезным. То же относится к дермальной пигментации, сложнее других поддающейся терапии. Подготовка заключается в назначении отбеливающих препаратов: выраженного эффекта они не окажут, но помогут не спровоцировать осложнение в виде поствоспалительной гиперпигментации. Если в их состав входят гидрохинон и койевая кислота, пациентам рекомендуется увеличить потребление жидкости, наносить успокаивающие наружные препараты, пользоваться средствами с высокой фотозащитой, принимать антиоксиданты.

РЕТИНОЛОВЫЕ ПИЛИНГИ DERMATIME (ИСПАНИЯ)

Являясь наиболее перспективными в anti-age терапии, ретиноловые пилинги могут активизировать метаболическую и митотическую активность базальных клеток (в результате происходит быстрое обновление эпидермиса) и фибробластов (это приводит к нормализации выработки коллагена, эластина, ГАГ, фибронектина). Испанский бренд профессиональной косметики Dermitime, специализирующийся на производстве химических пилингов, представляет линию разноуровневых ретиноловых пилингов. Одни из них работают на уровне эпидермиса и проявляют клинический эффект в виде выравнивания

рельефа кожи, применяются для шлифовки. Другие способны воздействовать на меланогенез, корректируя гиперпигментацию. Пилинг 5nRRT проявляет биологическую активность в дерме, где стимулирует обновление межклеточного матрикса (коллагена, эластина, ГАГ) и одновременно повышает эластичность сосудов, уменьшая проявление купероза. Golden Yellow Peel, содержащий различные формы витамина А, является абсолютной инновацией в косметических препаратах. Он обеспечивает максимальный омолаживающий эффект при минимальном раздражении кожи, свойственном всем ретиноидам.



НОВИНКА! GOLDEN YELLOW PEEL — набор для «желтого» пилинга (6 процедур).

- Антиоксидантный раствор ампульный (шаг 1-й): pH 4.8–5.2; состав — 10% аскорбил глюкозид, 4% ниацинамид, экстракты зверобоя, ромашки римской, ромашки аптечной, календулы, василька и липы сердцевидной, токоферол.
 - Крем с ретинолом в саше (шаг 2-й): комбинация чистого ретинола и интерактивного комплекса (ретинилпальмитат + полипептид моркови), токоферол.
- Пилинг, не имеющий аналогов, с амфифильным витамином А. Подходит для омоложения резистентной кожи после 35 лет.

YELLOW PEEL LIGHT

«Желтый» пилинг с инкапсулированным ретинолом 5% (1 процедура).

- Ампульный раствор для пилинга Pyruvic A40: pH 1.4–1.6; состав: пировиноградная кислота 40%, молочная кислота 5%.
 - Антиоксидантный раствор ампульный Retinol 5n RRT (шаг 1-й): pH 3,8–4,2; состав — аскорбиновая кислота 15%, ниацинамид 5%, экстракт календулы 1%, р-р ресвератрола 0,5%, экстракт ацеролы 0,5%.
 - Крем с ретинолом в саше Retinol 5n RRT (шаг 2-й): ретинол инкапсулированный 5%, ретинилпальмитат 0,3%, витамин Е 1%, пептидный комплекс, экстракт кувшинки белой, глицирризин.
- Рекомендован для поддержания эффекта лифтинга и омоложения кожи после курса Golden Yellow Peel.



RETINOL 5N RRT

Двухшаговый омолаживающий уход с инкапсулированным ретинолом 5% (6 процедур).


- Антиоксидантный раствор ампульный (шаг 1-й): pH 3,8–4,2; состав — аскорбиновая кислота 15%, ниацинамид 5%, экстракт календулы 1%, р-р ресвератрола 0,5%, экстракт ацеролы 0,5%.
- Крем с ретинолом в саше (шаг 2-й): ретинол инкапсулированный 5%, ретинилпальмитат 0,3%, витамин Е 1%, пептидный комплекс, экстракт кувшинки белой, глицирризин.

Разработан для омоложения чувствительной и/или куперозной кожи.



RETINOL 5N RRT

Набор саше с инкапсулированным ретинолом 5% для запечатывания химических пилингов (6 процедур). Retinol 5n RRT в саше: ретинол инкапсулированный 5%, ретинилпальмитат 0,3%, витамин Е 1%, пептидный комплекс, экстракт кувшинки белой, глицирризин. Применяется на завершающем этапе химического пилинга для усиления эффекта (лифтинга, осветления кожи, уменьшения сосудистого рисунка).



RETINOL 10

Набор саше с ретинолом 10% для запечатывания химических пилингов (6 процедур). Регенерирующий пилинг-крем Retinol 10 в саше: ретинол 10%, ретинилпальмитат 1%, молочная кислота 1%, экстракт водорослей, витамин Е, ферментативный экстракт. Применяется на завершающем этапе химического пилинга для усиления эффекта эксфолиации, осветления, уплотнения, выравнивания кожи.



Препараты линии **Optima (Keenwell, Испания)** предназначены для борьбы с морщинами. Освежающий дневной крем тройного действия содержит экстракт бурых водорослей вакаме, известных своими омолаживающими свойствами и лифтинг-эффектом. Коэнзим Q10 действует как антиоксидант, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, способствует профилактике старения кожи, ускоряя

синтез коллагена и предупреждая разрушение эластина, разглаживает мелкие морщины, помогает коже оставаться упругой и гладкой. Крем рекомендуется использовать совместно с сывороткой-ингибитором мимических морщин, которая мгновенно охлаждает и разглаживает кожу, делая ее шелковистой. Сыворотка имеет изысканную текстуру, подходит для деликатной зоны век.

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Астреля»; www.acosm.ru



Сыворотка **TC ESTESSIMO Pleacert (GC TANDEM, Япония)** предназначена для защиты кожи от проблем, возникающих из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и последствий стресса, а также для профилактики фотостарения. Активный комплекс Pleacert, ингибиторные пептиды и производные витамина С в форме магния аскорбил фосфата обеспечивают интенсивный уход за поврежденной кожей, улучшают ее состояние и внешний вид. При использовании сыворотки с ионофорезом кожу обрабатывают в течение 5 минут с отрицательного электрода.

Производитель — GC TANDEM; www.lebel.ru

Лаборатория **TEOXANE (Швейцария)** разработала восстанавливающую сыворотку **RHA LIP'SCULPT** для ежедневного ухода за губами. В ее составе: RHA (resilient hyaluronic acid) — упругая гиалуроновая кислота, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракты плюща, терминалии, женьшеня и корня пиона белозветкового, комплекс «Неодермил», светоотражающие компоненты. Активные вещества оказывают выраженное антивозрастное воздействие, увлажняют губы, визуально увеличивают их объем и разглаживают морщины. Специальная форма аппликатора способствует охлаждению кожи, стимулируя лифтинг-эффект. Сыворотка может быть использована в качестве основы под макияж губ.

Дистрибьютор в России и странах СНГ — компания «Мезо-Эксперт»; www.meso-expert.ru



Серия **PREMIUM IALURON TREATMENT (ELDAN Cosmetics, Швейцария/Италия)** на основе гиалуроновой кислоты предназначена для клиентов с первыми признаками старения кожи (снижение тургора, эластичности и уровня увлажненности, появление первых морщин, изменение контуров лица).

Высокое содержание гиалуроната натрия способствует быстрому устранению дефицита влаги, активизации синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Регулярное применение препаратов серии позволяет существенно улучшить качество кожи, повысить ее влагоудерживающие свойства, скорректировать овал лица.

Дистрибьютор — компания «Астарт»; www.eldancosmetics.ru



Крем-маска с фруктовыми кислотами **Ivory (ARKADIA, Россия)** выравнивает тон кожи, обеспечивает выраженный омолаживающий эффект. Фруктовые кислоты, арбутин и витамин С в

стабилизированной форме оказывают осветляющее действие. Коэнзим Q10 и соли магния способствуют восполнению энергетического ресурса кожи, а мембранные липиды восстанавливают ее барьерные свойства.

Производитель — Лаборатория косметики «Аркадия»; www.arkadia.spb.ru



Серия для век от ARKADIA

(Россия) включает гель и два крема на основе ламеллярных эмульсий. Крем «Поддерживающий уход» отдалает проявление первых признаков старения кожи. Крем «Специальный уход» устраняет застойные явления в области век, уменьшает выраженность «мешков» под

глазами. Включенный в его состав пептидно-протеиновый комплекс оказывает омолаживающее действие, разглаживает морщины. Гель «Интенсивный уход» снимает отечность, увлажняет кожу, идеально подходит для дневного ухода и в качестве основы под макияж.

Производитель — Лаборатория косметики «Аркадия»; www.arkadia.spb.ru



Лаборатория **TEOXANE** (Швейцария) разработала инновационный продукт — **гидрогелевую маску для кожного нанесения RHA** (resilient hyaluronic acid, упругой гиалуроновой кислоты), входящей в состав

филлеров Teosyal RHA. Сочетание технологии RHA и гидрогеля обеспечивает эффективное воздействие и мгновенный результат. Маска формирует матрицу из гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу. Также в составе препарата: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, Osilift (полисахариды овса), экстракт алоэ вера, фукогель (комбинация полисахаридов). Активные вещества тонизируют кожу, разглаживают морщины, препятствуют потере влаги. Эффект лифтинга заметен после первого применения. В упаковке две маски — для кожи лица и кожи шеи.

Дистрибьютор в России и странах СНГ — компания «Мезо-Эксперт»; www.meso-expert.ru

Сыворотка для глубокого увлажнения **Hydracure Hyaluronic Force Deep Hydration Serum** (GERMAINE DE CAPUCCINI, Испания)

содержит гиалуроновую кислоту с высоким, средним и низким молекулярным весом.

Она оказывает увлажняющее и смягчающее действие, делая морщины менее заметными, а кожу лица — более «наполненной». Этот концентрированный препарат — идеальное средство для сухой кожи, которая нуждается в дополнительном увлажнении. Он также адресован зрелой коже, страдающей от дегидратации и тусклости, жирной коже, коже с акне и постакне. Усиливает действие средств ежедневного ухода. Отлично подходит для мужчин благодаря легкой, быстро впитывающейся текстуре. Может использоваться как средство после бритья. Без запаха.

Эксклюзивный дистрибьютор — ГК «СпортМедИмпорт»; www.sportmedimport.com



Новинка осени 2017 года — **азелаиновые пилинги** от **Dermatime** (Испания) — заняли достойное место в ассортименте марки. Пилинг-раствор **Azelaic A15+** показан при акне, постакне, фолликулите,

розацеа, куперозе, гиперкератозе, себорее, мелазме, фотостарении. Он ослабляет сцепление корнеоцитов, оказывает бактериостатическое и противопрозоидное действие, успокаивает кожу, укрепляет стенки сосудов. Гель-пилинг **Azelaic A20+** решает проблемы фото- и хроностарения, мелазмы, купероза, розацеа, акне, постакне, фолликулита, себорейного дерматита. Средство оказывает бактериостатическое и противопрозоидное действие, укрепляет стенки сосудов, уменьшая выраженность купероза, стимулирует выработку коллагена и эластина, успокаивает кожу.

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Астрейя»; www.acosm.ru



Деликатный пилинг **«Азелогерманий конъюгированный с гиалуроновой кислотой» (FEMEGYL, Россия)** отно-

сится к всепогодным, однако в осенний период особенно актуален. Запатентованный германийорганический комплекс,

входящий в его состав, исполняет роль антигипоксанта и мощного антиоксиданта, ускоряет процессы регенерации, способствует запуску механизмов защиты кожи от внешних воздействий. Также в формулу включены азелаиновая и гиалуроновая кислоты. Пилинг не раздражает и не травмирует кожу, не требует реабилитации. Помимо эксфолирующего эффекта, он обеспечивает осветляющее, противовоспалительное и увлажняющее действие, стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию и тканевое дыхание.

Дистрибьютор — «Диарси Центр»; www.femegyl.ru

Новинки линии **Evolution Sphere** (Keenwell, Испания) — четыре препарата для интенсивного ухода за периорбитальной зоной.

Гиалуроновый гель, в который заключены кремевые шарики, поддерживает гидробаланс кожи. Защитный мультифункциональный комплекс устраняет признаки усталости, придавая коже век свежий отдохнувший вид. Антиоксидантный мультифункциональный комплекс уменьшает выраженность «мешков» и темных кругов под глазами, улучшает цвет кожи. Питательный мультифункциональный комплекс комбинирует увлажняющее и омолаживающее действие, питает и осветляет кожу, активизирует процессы ее восстановления. Лифтинговый мультифункциональный комплекс стимулирует синтез коллагена и эластина, разглаживает морщины, повышает упругость и эластичность кожи век.

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Астрейя»; www.acosm.ru



Регенерирующий лифтинговый концентрат **Endocare Tensage** (IFC, Испания) создан для интенсивного курсового anti-age ухода.

Включенный в его состав инновационный SCA-комплекс 50% (фильтрат секрета улитки *Cryptomphalus Aspersa*) обладает антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. Другие активные вещества: гидролизат протеинов сои, гликозаминогликаны, гексапептид-10, аргирелин, гидролизованная камедь цезальпинии, мочевины, аминокислоты дрожжей, трегалоза, инозитол, таурин, бетаин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты, аланин оказывают увлажняющее, миорелаксирующее, подтягивающее и осветляющее действие, обеспечивают flash-эффект, выравнивают тон кожи, придают ей более молодой и здоровый вид.

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Астрейя»; www.acosm.ru

